




# Centro Bellevue para el control del peso y la obesidad (212) 562-3917

La siguiente tabla le ayudará a decidir cuál es la opción adecuada para usted.



	<b>Bypass</b> 	<b>Banda</b> 	<b>Manga</b> 
<b>Pérdida de peso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se pierde, de promedio, el 70% del exceso de peso</li> <li>Aproximadamente el 5% -10% de los pacientes recuperan el peso o no lo pierden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se pierde, de promedio, el 40% del exceso de peso.</li> <li>Más variabilidad de pérdida de peso.</li> <li>Aproximadamente el 15-20% de los pacientes recuperan el peso o no lo pierden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se pierde, de promedio, el 60% del exceso de peso.</li> <li>Falta de datos a largo plazo más allá de 5 años.</li> <li>El índice de fracaso es aproximadamente el 15-20%</li> </ul>
<b>Seguimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No tan frecuente como la banda, igual que la manga gástrica.</li> <li>Es importante para controlar deficiencias nutricionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensual durante el primer año.</li> <li>El seguimiento es esencial para realizar ajustes y que la banda tenga los efectos deseados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No tan frecuente como la banda, igual que el bypass.</li> </ul>
<b>Complicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El índice de complicaciones es superior al de la banda o la manga. Las complicaciones pueden ser más graves o potencialmente fatales porque es una cirugía más compleja (implica cortar y alterar parte del circuito intestinal).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las complicaciones rara vez son potencialmente mortales.</li> <li>Es la opción quirúrgica más segura para perder peso. Es la menos invasiva porque el estómago no se corta ni se grapa (como sí sucede con el bypass y la manga).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La probabilidad de complicaciones generales es menor que en el bypass porque no se altera parte del circuito intestinal, pero es mayor que en la banda.</li> </ul>
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La opción con la que más peso se pierde y sobre la que más datos hay acerca de su eficacia a largo plazo.</li> <li>Pérdida de peso rápida.</li> <li>El índice de fracaso es el más bajo.</li> <li>El potencial de curación de la diabetes es el más alto (80%).</li> <li>No implica implantar cuerpos extraños.</li> <li>No hay ajustes mensuales.</li> <li>Es más difícil hacer trampas que con la banda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El estómago no se corta ni se grapa.</li> <li>Los riesgos nutricionales son mínimos.</li> <li>Ajustable: pérdida de peso gradual que se puede controlar con los ajustes de la banda.</li> <li>50-60% de curación de diabetes.</li> <li>Las complicaciones rara vez son potencialmente mortales.</li> <li>Es el procedimiento de pérdida de peso más seguro.</li> <li>Es "reversible", pero esperamos que se la quede de por vida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La pérdida de peso es superior a la que se consigue con la banda (hasta 5 años).</li> <li>No implica implantar cuerpos extraños.</li> <li>No hay ajustes mensuales.</li> <li>Menos complicaciones generales que el bypass porque no es necesario conectar o alterar parte del circuito intestinal.</li> <li>Preserva la anatomía natural.</li> <li>Si se recupera el peso después de 2-3 años se puede realizar un bypass (o implantar una banda).</li> </ul>
<b>Inconvenientes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Más invasiva: implica cortar el estómago y alterar parte del circuito intestinal.</li> <li>Las complicaciones, aunque son poco habituales, pueden ser potencialmente mortales.</li> <li>Más difícil de revertir que la banda.</li> <li>No se puede hacer un seguimiento endoscópico del estómago.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se implanta un objeto extraño en el cuerpo.</li> <li>Visitas de seguimiento frecuentes.</li> <li>Requiere un mayor compromiso.</li> <li>Es más fácil hacer trampas que con el bypass gástrico.</li> <li>Mayor índice de fracaso que el bypass y la manga.</li> <li>Menos pérdida de peso comparado a el bypass y la manga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implica cortar el estómago, es más invasiva que la banda.</li> <li>No hay muchos datos después de 5 años.</li> <li>Se desconoce la recuperación de peso a largo plazo.</li> <li>No todas las compañías aseguradoras cubren la manga.</li> </ul>