וואס איז נעילאַקסאָון?

What Is Naloxone?

איבער נעילאַקסאָון

נעילאַקסאָון איז א זיכערע מעדיצין וואס קען אפשטעלן די אנטוויקלונג פון אן אָפּיויד אָווערדאָוז.

עס ארבעט נאר אויף אפּיוידס (צום ביישפיל הערא‍ָואין, פענטאניל און ווייטאג מעדיצין וואס דארף האבן א פּרעסקריפּשען) אבער עס איז זיכער צו נוצן אפילו אויף א מענטש וואס האט נישט גענומען קיין אפּיוידס.

וויכטיג: זאגט פאר אנדערע וואו די נעילאַקסאָון ליגט און וויאזוי עס צו נוצן.

וויסן אויב עס איז אן אָווערדאָוז

סימנים פון אן אפּיויד אָווערדאָוז רעכענען אריין:

- נישט רעאגירן אדער פארלירן באוואוסטזיין
- שטייטע אדער אויפהערן אטעמען
- בלויע, גרויע אדער ווייסע ליפן אדער שפיץ פון די פינגער
- זיך הערן ווי שנארכן אדער גארגלען

קוקט אויב דער מענטש רעאגירט בעפארן גיבן נעילאַקסאָון:

- שרייט הויך צו זעהן אויב דער מענטש רעאגירט.
- אויב זיי רעאגירן נישט, רייבט אריין א פארמאכטע פויסט אויף דיביין אין די מיטן פון די ברוסטקאסטן (די סטערנום).



אויב דער מענטש רעאגירט נישט צו די רייבן אויף די ביין, איז עס אן עמערדזשענסי!

וואס צו טוהן אין פאל פון אן אָווערדאָוז

1. רופט **911** פאר מעדיצינישע הילף. זאגט זיי אז איינער אטעמט נישט.
2. גיבט נעילאַקסאָון. פרובירט נישט אויס די מעדיצין צו זעהן אויב עס ארבעט, עס קען נאר גענוצט ווערן איינמאל.



עפנט | לייגט אריין | דרוקט

מען דארף גארנישט צוזאמשטעלן. שפריצט אריין די נעילאַקסאָון אין איין נאז לאך דורכן ארייגשטופן די פלאָנדזשער.

אויב דער מענטש רעאגירט נישט ביז צוויי מינוט, גיבט א צווייטע דאזע.

3. אטעמט אריין אדער מאכט CPR אויף דעם מענטש ווי שנעלער. די נעילאַקסאָון קיט האט אויך א שילד צו באשיצן די פנים.
   - בויגט דעם מענטשן'ס קאפ אויף הונטן און קוועטשט צו זייער נאז.
   - בלאזט אריין צוויי אטעמען און קוקט צו זעהן די ברוסט זיך אויפהייבנדיג.
   - גיבט ווייטער איין אטעם יעדע פינף סעקונדעס.

4. ווען איר גיבט נישט נעילאַקסאָון אדער אטעמען, לייגט דעם מענטש אויף זייער זייט צו פארמיידן פון זיי זיך צו שטיקן.



נאכן גיבן נעילאַקסאָון

בלייבט מיט דעם מענטש ביז מעדיצינישע הילף קומט אן.

- נעילאַקסאָון ארבעט פאר 30 ביז 90 מינוט און דורכאויס די צייט קען עס פאראורזאכן סימפטאמען וואס קומען ווען די קערפער פארלירט א דראג צו וואס עס איז צוגעוואוינט.
- נוצן מער דראגס איז נישט ווארשיינליך צו פארגרינגערן די סימפטאמען, אבער עס קען יא פארגרעסערן די אויסזיכטן פון נאך אן אָווערדאָוז.

באריכטעט דאס באנוץ מיט נעילאַקסאָון צו דעם פראגראם פון וואו איר האט עס באקומען, אדער נוצט די Stop OD NYC עפּ.

באקומט א נייע קיט אויב איר נוצט איין אדער מער דאזעס אדער ווען די נעילאַקסאָון לויפט אפ.

שטיצע

רופט NYC Well אויף 888-692-9355 24 שעה א טאג, 7 טעג א וואך צו טרעפן נעילאַקסאָון אדער פאר שטיצע מיט דראג באנוץ אדער גייסטישע געזונטהייט.

NYC Health

8.22 Yiddish