

甲苯噻嗪 (Xylazine) 是什麼？

甲苯噻嗪（通常稱作「鎮靜劑」）是獸醫用來讓動物放鬆或鎮靜的藥物。該藥不屬阿片類藥物。紐約市 (NYC) 在其藥品供應中發現了甲苯噻嗪，且該藥幾乎無一例外地與吩坦尼 (fentanyl)（一種強效合成阿片類藥物）用在一起。



甲苯噻嗪有何副作用？

甲苯噻嗪會引起困倦、反應遲鈍、低血壓、心率減慢和呼吸減弱等症狀。



甲苯噻嗪是否已獲准用於人類？

沒有。美國食品和藥物管理局 (Food and Drug Administration) 僅批准將甲苯噻嗪用於動物。



是否還在其他地方發現了甲苯噻嗪？

美國在幾個州及波多黎各的藥品供應中發現了甲苯噻嗪。




甲苯噻嗪通常是被單獨發現還是與其他藥物一同被發現？

在紐約市，甲苯噻嗪僅在含有吩坦尼的藥品中被發現。



為什麼通常甲苯噻嗪與吩坦尼會被一同發現？

吩坦尼的藥效持續時間比其他阿片類藥物（如海洛因）要短。將甲苯噻嗪加入吩坦尼中可以調控藥效持續時間。但大多數人不知道自己的藥物中摻入了甲苯噻嗪。



使用甲苯噻嗪是否會導致用藥過量？

會的。大量使用甲苯噻嗪會導致極度鎮靜、心率減慢或呼吸減弱或停止。



納洛酮 (naloxone) 對甲苯噻嗪是否有效？

由於甲苯噻嗪不屬阿片類藥物，因此納洛酮無法逆轉其藥效。然而，鑒於甲苯噻嗪幾乎總是與阿片類藥物一同使用，所以如果您認為有人出現用藥過量跡象，應給其服用納洛酮並撥打 **911**。即便患者在甲苯噻嗪的作用下未能脫離鎮靜狀態，納洛酮也可逆轉阿片類藥物的藥效。



如果有人使用了甲苯噻嗪，之後又服用了納洛酮以緩解阿片類藥物用藥過量，情況會怎樣？

此人可能恢復呼吸，但是在甲苯噻嗪的作用下，仍會處於鎮靜狀態。此時若患者尚在呼吸，應將其至於救護體位（側臥）以等待救援。如果您有脈搏血氧計，請用其監測患者的血氧水準。



甲苯噻嗪有何其他影響？

經常使用甲苯噻嗪的人員可能出現嚴重的皮膚潰瘍和膿腫，即使沒有注射甲苯噻嗪（例如，可透過吸煙或鼻吸而攝入）也會如此。與其他皮膚創傷相比，甲苯噻嗪引起之皮膚創傷可能惡化更快，癒合時間也會更久。



人們是否會出現甲苯噻嗪戒斷反應？

會的。經常使用甲苯噻嗪的人員會面臨戒斷風險。戒斷症狀包括易怒、焦慮、不安、心率加快及高血壓。



是否有辦法檢測藥物中有無甲苯噻嗪？

可以聯絡並造訪下列注射器服務計畫，以對自己的藥物進行甲苯噻嗪檢測並獲得降低傷害服務：

- **OnPoint NYC**：請造訪 onpointnyc.org 或撥打 212-828-8464。
- **St. Ann's Corner of Harm Reduction**：請造訪 sachr.org 或撥打 718-585-5544。
- **Housing Works**：請造訪 housingworks.org 或撥打 347-473-7400。
- **VOCAL-NY**：請造訪 vocal-ny.org 或撥打 718-802-9540。

還可向製造商在線訂購甲苯噻嗪試紙供個人使用。



如何降低甲苯噻嗪造成傷害的風險？

如果您知道或認為您的藥物含有甲苯噻嗪：

- 應避免使用這些藥物，尤其要避免獨自使用或在長時間失去知覺時會有危險的場所使用。
- 應將藥物攜帶至用藥過量預防中心，在監督下使用。

如果您有皮膚創傷，停止使用甲苯噻嗪會有利於傷口癒合。如果您的皮膚創傷不能好轉或癒合，請諮詢您的健康照護提供者。如需獲得幫助以查找提供者，請撥打 **311** 或 844-692-4692。