

Cos'è la xilazina?

La xilazina, nota anche come “tranq”, è un farmaco utilizzato dai veterinari come tranquillante o sedativo per animali. Questa sostanza, che non è un oppioide, è stata identificata nelle partite di droga presenti nella Città di New York (NYC), quasi sempre in combinazione con il fentanil (un potente oppioide sintetico).



Quali sono gli effetti collaterali della xilazina?

La xilazina può causare sonnolenza, apatia, bassa pressione sanguigna, bradicardia e respirazione rallentata.



La xilazina è approvata per l'uso sull'uomo?

No, la xilazina è stata approvata dall'Agenzia per gli alimenti e i medicinali (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti solo per uso veterinario.



In quali altre zone è stata trovata la xilazina?

Questa sostanza è stata identificata anche nelle partite di droga di altri stati degli Stati Uniti e in Porto Rico.




La xilazina viene utilizzata solitamente da sola o in combinazione con altre sostanze?

Nella Città di New York la xilazina è stata trovata solamente in droghe che contengono fentanil.



Perché la xilazina viene combinata comunemente con il fentanil?

Gli effetti del fentanil non sono duraturi come quelli di altri oppioidi (ad esempio l'eroina). L'aggiunta di xilazina consente di prolungare gli effetti del fentanil, molto spesso all'insaputa dei consumatori stessi.



È possibile andare in overdose di xilazina?

Sì. Dosi elevate di questa sostanza possono causare sedazione estrema, bradicardia e rallentamento o interruzione respiratoria.



Il naloxone neutralizza gli effetti della xilazina?

La xilazina non è un oppioide, quindi il naloxone non ne neutralizza gli effetti. Tuttavia, la xilazina è quasi sempre utilizzata in combinazione con gli oppioidi, pertanto se pensi di essere in presenza di un'overdose, somministra subito il naloxone alla persona coinvolta e chiama il **911**. Il naloxone neutralizzerà gli effetti degli oppioidi, anche se la persona interessata resterà sedata a causa della xilazina.



Cosa succede quando viene somministrato il naloxone per invertire un'overdose da oppioidi a qualcuno che ha assunto xilazina?

La persona potrebbe riprendere a respirare anche se risulta ancora sedata a causa della xilazina. Se la persona respira, mettila nella posizione laterale di sicurezza e attendi l'arrivo dei soccorsi. Se hai a disposizione un saturimetro, utilizzalo per monitorare i livelli di ossigeno della persona coinvolta.



Quali altri effetti può avere la xilazina?

L'assunzione continua di xilazina può causare ulcere cutanee e ascessi, anche nei casi in cui la sostanza non venga iniettata, ma fumata o sniffata. Le ferite cutanee causate dalla xilazina possono peggiorare in breve tempo ed essere più difficili da curare rispetto a lesioni di altra origine.



È possibile avere crisi di astinenza da xilazina?

Sì. Chi assume regolarmente questa sostanza è a rischio di crisi di astinenza. I sintomi comprendono irritabilità, stati d'ansia, sensazione di malessere, battito cardiaco accelerato e pressione alta.



È possibile sottoporre le droghe a test per verificare la presenza di xilazina?

Sì, ci si può rivolgere ai seguenti Programmi di scambio siringhe per far testare le proprie droghe alla ricerca della xilazina e richiedere servizi di riduzione del danno:

- **OnPoint NYC:** visita il sito onpointnyc.org o chiama il numero 212-828-8464.
- **St. Ann's Corner of Harm Reduction:** visita il sito sachr.org o chiama il numero 718-585-5544.
- **Housing Works:** visita il sito housingworks.org o chiama il numero 347-473-7400.
- **VOCAL-NY:** visita il sito vocal-ny.org o chiama il numero 718-802-9540.

È inoltre possibile ordinare online le strisce reattive alla xilazina dai produttori, per uso personale.



In che modo è possibile ridurre il rischio di danno da xilazina?

Se ritieni o sospetti che le droghe che assumi contengano xilazina:

- evita di utilizzarle, soprattutto quando sei da solo o in luoghi dove potrebbe essere pericoloso restare in stato di incoscienza per lunghi periodi;
- portale presso un centro di prevenzione dell'overdose e utilizzale sotto la supervisione del personale del centro.

Se hai delle lesioni cutanee, interrompi l'utilizzo della xilazina per una migliore possibilità di guarigione. Se le ferite non scompaiono né migliorano, contatta il tuo operatore sanitario. Se hai bisogno di aiuto per trovare un operatore sanitario, chiama il **311** o il numero 844-692-4692.