

# ডক্সি PEP কীভাবে নেবেন

কন্ডোমবিহীন সহবাসের পর ডক্সি PEP (অ্যান্টিবায়োটিক ডক্সিসাইক্লিন) গ্রহণ — মৌখিক, পায়ু দ্বারা বা যোনি/সামনের-গর্তের সহবাসে কন্ডোম ব্যবহার না করা হলেও — আপনার সিফিলিস, গনোরিয়া এবং ক্ল্যামাইডিয়া হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।

কন্ডোমবিহীন যৌন মিলনের 24 ঘন্টার মধ্যে নিলে Doxy PEP ভাল কাজ করে।

## প্রতিদিন (বা তার বেশি) সহবাস করলে

কন্ডোমবিহীন যৌন মিলনের পর 24 ঘন্টার ভেতরে (এবং অনধিক 72 ঘন্টার মধ্যে) ডক্সিসাইক্লিনের দুটি 100-মিলিগ্রাম (মিগ্রা) পিল নিন।

কন্ডোমবিহীন সহবাসের সময় প্রতিদিন যতবার ডক্সিসাইক্লিন নেবেন 24 ঘন্টার মধ্যে 200 মিলিগ্রামের বেশি (দুটি 100 মিলিগ্রাম পিল) গ্রহণ করবেন না।

পূর্ববর্তী ডোজের কমপক্ষে 24 ঘন্টা পরে এবং আপনার শেষবার কন্ডোমবিহীন সহবাসের 72 ঘন্টার মধ্যে শেষ ডোজটি নিন।

