

念珠菌（酵母菌） 感染

酵母菌微生物自然生长于生殖器区域。酵母菌感染是由于阴道内部或阴茎上有过多的酵母菌微生物所引发的。酵母菌感染尽管可以通过性伴侣传播，但不被认为是一种性传播感染(STI)，因为它在没有性行为时也可发生。



酵母菌感染



症状

阴道症状包括：

- 瘙痒
- 疼痛
- 灼烧
- 粘稠分泌物（类似于茅屋奶酪）

阴茎症状包括：

- 瘙痒
- 皮疹

检测

医疗保健提供者通过拭子在阴道取样后进行检测，以查看阴道内部是否有酵母菌感染。他们通过目测检查来诊断阴茎是否有酵母菌感染。

治疗

阴道的酵母菌感染可通过片剂或置于阴道内的药物进行治疗，例如：药膏或栓剂。阴茎的酵母菌感染可通过片剂或外用于阴茎的药膏进行治疗。许多这类治疗方法无需开具处方。

治疗理由

若不治疗，酵母菌感染可造成不适。

性伴侣

性伴侣无需针对酵母菌感染接受治疗。

酵母菌感染和妊娠

我们尚不知晓在妊娠期间患有酵母菌感染的任何严重影响。

纽约市性健康诊所提供机密且免费或廉价服务，包括STI和HIV检测。

如需查找一家诊所，请访问：
nyc.gov/health/clinics。